

RETRAIT D'AIGUILLE DE CATHÉTER À CHAMBRE IMPLANTABLE (CCI)

UNIFORMISATION DES PRATIQUES

Ce document a pour but d'uniformiser les pratiques concernant le retrait d'aiguille de cathéter à chambre implantable au sein des services d'oncologie pédiatrique du CHUV (PONH et PONJ).

Attention :

- La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu.
- Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié.
- La forme et le contenu de ce document doivent faire l'objet d'amélioration continue dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

DIRECTIVE POUR L'UNITE D'HEMATOLOGIE ONCOLOGIE – SERVICE DE PEDIATRIE

1. Le retrait de l'aiguille se fait selon la méthode de [rinçage pulsé](#) avec 10 ml de NaCl 0.9% et un verrou en [pression positive](#) avec du NaCl 0.9%.
2. Le verrou hépariné n'est plus en vigueur pour l'intégralité de l'Unité d'oncologie pédiatrique du CHUV (secteurs PONH et PONJ), sauf cas particuliers ET sur ordre médical.

HISTORIQUE DES RÉVISIONS



Version	Date	Raison de la révision	Auteur/Relecteur(s)	Validation	Diffusion
V01	30.05.2023	1 ^{ère} version	A. Forestier, ICLS	Dr. Raffaele Renella Dr. Manuel Diezi	Mai 2023