

TDM À PRÉLEVER IMPÉRATIVEMENT PAR PRISE DE SANG CAPILLAIRE

LES IMMUNOSUPPRESSEURS

Inhibiteurs de calcineurine : ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, éverolimus

LES ANTIFONGIQUES

Antifongiques azolés : posaconazole, voriconazole, isavuconazole, fluconazole

TDM QUI PEUVENT ÊTRE PRÉLEVÉS SUR UNE VOIE VEINEUSE (VVP OU VVC)

Les médicaments suivants peuvent être prélevé sur une voie veineuse périphérique, même si celle-ci est utilisée pour l'administration du médicament en question, **à condition qu'elle soit rincée suffisamment et que le premier sang ne soit pas utilisé pour le dosage**

ANTIBIOTIQUES

Aminoglycosides : gentamicine, amikacine, tobramycine, vancomycine

Beta-lactames : piperacilline, meropenem, cefepime, levofloxacin, ceftazidime

(soit près de 300 dosages en 2021 pour vous, soit environ 50% du nombre des dosages en 2021)

CHIMIOTHÉRAPIES :

Méthotrexate

MÉDICAMENTS POUR LESQUELS IL N'Y A PAS DE DONNÉES CLAIRES DANS LA LITTÉRATURE

ANTIÉPILEPTIQUES

Ces médicaments, par leurs caractéristiques physicochimiques, pourraient être sujet à des interactions avec les plastiques et **dans ces conditions, un prélèvement capillaire est vivement recommandé.**

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PRÉLÈVEMENTS CAPILLAIRES

Ne pas utiliser de crème HEMOLUBE ou toute crème siliconée lors de la réalisation des prélèvements capillaires, ces crèmes peuvent biaiser les taux.

			
Rédaction :	Validation :	Création :	Modification :
Pascal André, PCL	Manuel Diezi	25.04.2022	03.05.2022